




التمرين :



I) الدالة المعرفة على \mathbb{R} كما يلي: $g(x) = 2x^3 + 9x + 24$ و (C_g) تمثيلها البياني كما هو مبين في الشكل .

قراءة بيانية :

أ) حدد إشارة $g(-2)$ و $g(-1)$.ب) استنتج وجود عدد حقيقي α وحيد من المجال $[-2; -1]$ بحيث $g(\alpha) = 0$ ، ثم تحقق أن: $-1,70 < \alpha < -1,60$
ج) استنتاج إشارة $g(x)$ على \mathbb{R} .

II) $f(x) = \frac{-x^3 - 6}{2x^2 + 3}$: الدالة المعرفة على \mathbb{R} بـ :

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.أ) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = \frac{x \cdot g(-x)}{(2x^2 + 3)^2}$.

ب) استنتاج أن الدالة f متاقضة تماما على كل من المجالين $[-\infty; 0]$ و $[-\alpha; +\infty)$ و متزايدة تماما على المجال $[\alpha; -\infty)$. ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .

أ) بين أن: $f(x) + \frac{x}{2} = \frac{3x - 12}{2(2x^2 + 3)}$ ، ثم استنتاج أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = -\frac{x}{2}$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) .

ب) أدرس وضعية المنحنى (C_f) إلى المستقيم (Δ) .

أ) نقبل أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة x_0 حيث: $-1,82 < x_0 < -1,81$ - ارسم بعناية المنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) . ($f(-\alpha) \approx f(1,75) \approx -1,2$)

أ) بيّن أن h دالة زوجية .

ب) لاحظ أنه من أجل $x \in \mathbb{R}^+$ لدينا: $h(x) = f(x)$. استنتاج كيفية رسم (Γ) انطلاقا من (C_f) ثم أرسمه .

حل التمرين :

- الإشارة : $g(-2) < 0$ ، $g(-1) > 0$ (من البيان و ليس حسابيا)


- الدالة g معرفة و مستمرة و رتبة تماما (متزايدة تماما) على المجال $[-2; -1]$

و لدينا $g(-2) \times g(-1) < 0$ إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $\alpha \in]-2; -1[$

- التحقق أن $-1,70 < \alpha < -1,60$ لدينا :

$$\begin{cases} g(-1,70) = -1,126 \\ g(-1,60) = 1,408 \end{cases} \Leftrightarrow g(-1,70) \times g(-1,60) < 0$$

إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $-1,70 < \alpha < -1,60$



- حساب النهايات :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^3 - 6}{2x^2 + 3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^3}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^3 - 6}{2x^2 + 3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^3}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{2} = -\infty$$

- المشتقة :

الدالة f قابلة للاشتقاق على \mathbb{R} و دالتها المشتقة هي :

$$f'(x) = \frac{-3x^2(2x^2 + 3) - 4x(-x^3 - 6)}{(2x^2 + 3)^2} = \frac{-6x^4 - 9x^2 + 24x}{(2x^2 + 3)^2} = \frac{x(-2x^3 - 9x + 24)}{(2x^2 + 3)^2}$$


$$f'(x) = \frac{x(2(-x)^3 + 9(-x) + 24)}{(2x^2 + 3)^2} = \frac{x \cdot g(-x)}{(2x^2 + 3)^2}$$

- اتجاه تغير الدالة f : إشارة المشتقة من إشارة $x \cdot g(-x)$.

أولاً نعين إشارة $g(-x)$:

إذا كان $-x \leq \alpha$ فإن $g(-x) \leq 0$ و منه : إذا كان $x \geq -\alpha$ فإن $g(-x) \leq 0$

إذا كان $-x \geq \alpha$ فإن $g(-x) \geq 0$ و منه : إذا كان $x \leq -\alpha$ فإن $g(-x) \geq 0$




و منه إشارة المشقة هي :

	$-\infty$	0	$-\alpha$	$+\infty$
x	-	0	+	+
$g(-x)$	+	+	0	-
$f'(x)$	-	0	0	-

و منه الدالة f متناقصة تماما على كل من المجالين $[0; -\alpha]$ و متزايدة تماما على $[-\alpha; +\infty]$.

- جدول تغيرات الدالة :

$$f(0) = \frac{-(0)^3 - 6}{2(0)^2 + 3} = -2$$



- التبيين :

$$f(x) + \frac{x}{2} = \frac{-x^3 - 6}{2x^2 + 3} + \frac{x}{2} = \frac{2(-x^3 - 6) + x(2x^2 + 3)}{2(2x^2 + 3)} = \frac{-12 + 3x}{2(2x^2 + 3)}$$

- المستقيم المقارب المائل :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[f(x) - \left(-\frac{x}{2} \right) \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{-12 + 3x}{2(2x^2 + 3)} \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{3x}{4x^2} \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{3}{4x} \right] = 0$$


إذن : المنحني (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل (Δ) معادلته $y = -\frac{x}{2}$ بجوار $-\infty$ و $+\infty$.

- الوضع النسبي بين (Δ) و (C_f) :


$$f(x) - y_\Delta = \frac{-12 + 3x}{2(2x^2 + 3)}$$

ندرس إشارة الفرق :

$$f(x) - y_\Delta = 0 \Leftrightarrow -12 + 3x = 0 \Leftrightarrow x = 4$$



- الرسم :



- التبيين أن الدالة h زوجية :

من أجل $x \in \mathbb{R}$ لدينا : $-x \in \mathbb{R}$ متاظر بالنسبة إلى الصفر (

$$h(-x) = f(|-x|) = f(|x|) = h(x)$$

ومنه h دالة زوجية

- كيفية رسم المنحنى (Γ) الممثل للدالة h :

لما $x \in \mathbb{R}^+$ المنحنى (Γ) منطبق على المنحنى (C_f) .

لما $x \leq 0$ المنحنى (Γ) متاظر بالنسبة إلى محور التراتيب لأن الدالة h زوجية .

- رسم المنحنى (Γ) انطلاقاً من (C_f) :

الرسم في نفس المعلم السابق (المنحنى الممثل بنقاط متقطعة)



الروابط المباشرة

المواض

www.dzexamsbac.com/module/mathematiques

الرياضيات

www.dzexamsbac.com/module/physique

العلوم الفيزيائية

www.dzexamsbac.com/module/sciences-naturelles

علوم الطبيعة والحياة

www.dzexamsbac.com/module/arabe

اللغة العربية

www.dzexamsbac.com/module/francais

اللغة الفرنسية

www.dzexamsbac.com/module/anglais

اللغة الإنجليزية

www.dzexamsbac.com/module/histoire-geographie

التاريخ و الجغرافيا

www.dzexamsbac.com/module/tarbia-islamia

ال التربية الإسلامية

www.dzexamsbac.com/module/economie

الاقتصاد والمناجمنت

www.dzexamsbac.com/module/comptabilite

التسخير المحاسبي والمعالي

www.dzexamsbac.com/module/droit

القانون

www.dzexamsbac.com/module/genie-civil

الهندسة المدنية

www.dzexamsbac.com/module/genie-mecanique

الهندسة الميكانيكية

www.dzexamsbac.com/module/genie-procedes

هندسة الطرائق

www.dzexamsbac.com/module/genie-electrique

الهندسة الكهربائية

www.dzexamsbac.com/module/philosophie

الفلسفة

www.dzexamsbac.com/module/allemand

اللغة الألمانية