

❖ فرض الفصل الأول في مادة الرياضيات ❖

المدة: ساعتان

المستوى: 3 ع ت 2;1

ملاحظة: تقبل الإجابات الدقيقة والواضحة فقط .

نعتبر في كل ما يأتي المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

التمرين الأول :

$$\begin{cases} g(x) = \frac{x^2 + |x|}{x^2 - |x|} & ; \quad x \neq 0 \\ g(x) = -1 & ; \quad x = 0 \end{cases}$$

لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1; 1\}$ بـ :

1. أكتب $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة .
2. ادرس قابلية اشتقاق الدالة g عند 0 ، ثم فسر النتيجة هندسيا .
3. هل الدالة g مستمرة عند 0 ؟ برر

التمرين الثاني :

لتكن الدالة العددية f المعرفة على \mathbb{R} بما يلي : $f(x) = -x + 1 + e^{2x} - e^x$ ، (C_f) التمثيل البياني للدالة f .

1. أدرس تغيرات الدالة f .
2. بين أن المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = -x + 1$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$. أدرس الوضعية النسبية للمنحنى (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .
3. (أ) ليكن x_0 عدد حقيقي، نعتبر المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة x_0 .
• عين قيمة x_0 حتى يكون (T) موازيا للمستقيم (d) ثم أكتب معادلة ديكارتية للمماس (T) .
(ب) بعد حساب $f''(x)$ (المشتقة الثانية للدالة f) بين أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها .
(ج) أرسم (T) ، (d) و (C_f) .
4. ليكن m عدد حقيقي . ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة التالية:
$$e^{2x} - e^x + 1 - m = 0$$

التمرين الثالث :

الجزء الأول : لتكن الدالة g المعرفة على \mathbb{R} بـ : $g(x) = x^3 - 3x - 3$

1. أدرس تغيرات الدالة g .
2. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α محصورا في المجال $[2; 2.5]$
3. عين حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$

الجزء الثاني : نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1; 1\}$ بـ : $f(x) = \frac{2x^3 + 3}{x^2 - 1} + ax + b$ حيث a و b عددين حقيقيين ، وليكن (C_f) تمثيلها البياني .
• عين a و b إذا علمت أن $f(0)$ قيمة حدية عظمى قيمتها (-2) .
نضع $a = 0$ و $b = 1$:

1. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R} - \{-1; 1\}$ فإن : $f'(x) = \frac{2x}{(x^2 - 1)^2} \times g(x)$
2. إستنتج تغيرات الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

3. بين أن $f(\alpha) = 3\alpha + 1$ ثم عين حصرًا لـ $f(\alpha)$.

4. بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = 2x + 1$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) ، ثم أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

5. ارسم كلا من (Δ) والمنحنى (C_f) .

6. لتكن h دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{-1; 1\}$ بـ : $h(x) = \frac{2|x|x^2 + 3}{x^2 - 1} + 1$

(أ) أثبت أن الدالة h زوجية .

(ب) إشرح كيف يمكن إنشاء (C_h) التمثيل البياني للدالة h ، ثم أنشئه .

ديزاد إكزام بكالوريا | DzExams BAC

<https://www.dzexamsbac.com>



الروابط المباشرة

المواد

www.dzexamsbac.com/module/mathematiques

الرياضيات

www.dzexamsbac.com/module/physique

العلوم الفيزيائية

www.dzexamsbac.com/module/sciences-naturelles

علوم الطبيعة والحياة

www.dzexamsbac.com/module/arabe

اللغة العربية

www.dzexamsbac.com/module/francais

اللغة الفرنسية

www.dzexamsbac.com/module/anglais

اللغة الإنجليزية

www.dzexamsbac.com/module/histoire-geographie

التاريخ و الجغرافيا

www.dzexamsbac.com/module/tarbia-islamia

التربية الإسلامية

www.dzexamsbac.com/module/economie

الإقتصاد والمناجمت

www.dzexamsbac.com/module/comptabilite

التسيير المحاسبي والمالي

www.dzexamsbac.com/module/droit

القانون

www.dzexamsbac.com/module/genie-civil

الهندسة المدنية

www.dzexamsbac.com/module/genie-mecanique

الهندسة الميكانيكية

www.dzexamsbac.com/module/genie-procedes

هندسة الطرائق

www.dzexamsbac.com/module/genie-electrique

الهندسة الكهربائية

www.dzexamsbac.com/module/philosophie

الفلسفة

www.dzexamsbac.com/module/allemand

اللغة الألمانية